


Gęś zbożowa (*Anser fabalis*)



I. Występowanie i siedlisko

Gęś zbożowa jest ptakiem wędrownym. Gnieździ się w strefie tundry i tajgi, czyli w północnej Skandynawii, w północno-wschodniej Europie i Azji. Ich siedliskiem są najczęściej bagniste tereny, śródleśne jeziora, gdzie potrafi przebywać w luźnych grupach. W Polsce pojawia się w październiku i listopadzie oraz w lutym i marcu, na przelotach. Sporadycznie przy łagodnych zimach potrafi w północno-zachodniej Polsce przeczekać do wiosny. Jest to gatunek gęsi wyjątkowo lubiący ląd i do zimowania wykorzystuje tereny pokryte niską roślinnością.

II. Charakterystyka ogólna

Zbożówka jest ptakiem mniejszym od gęgawy. Jest ona również zdecydowanie ciemniejsza od swojej kuzynki. Zwłaszcza ciemnoszara głowa i szyja są cechą rozróżniającą te ptaki. Poza tym szyja zbożówki jest krótsza. Również wiośła i dziób mają inną barwę, są zdecydowanie bardziej pomarańczowe. Dziób posiada czarny paznokieć z przodu i czarna obwódka u nasady, różnej wielkości zależną od podgatunku. Nie ma różnic w ubarwieniu samca i samicy, jak i osobników młodocianych.

III. Odżywianie

Gęsi zbożowe pobierają pokarm zawsze na lądzie, a jedzą wyłącznie rośliny. W czasie przelotów żerują na ścierniskach po kukurydzy, na świeżych jesiennych zasiewach zbóż, a później na oziminach.

IV. Rozmnażanie i rozwój

Zbożówki dojrzałość płciową osiągają w wieku 2-3 lat i wówczas przystępują do lęgów. Budową gniazda nie różnią się od innych gęsi. Starają się je ulokować w niedostępnym i mało widocznym miejscu, zawsze wyścielają je puchem. Składają do 6 jaj, które wysiadują około 4 tygodni. Pisklęta są pokryte gęstym oliwkowo-brązowym puchem chroniącym przed przemoczeniem. Młode lotność uzyskują po 6 tygodniach, a usamodzielniają się już po 40-50 dniach.

V. Zachowanie

Są towarzyskim ptakami i tworzą duże stada, w których dość często można wypatrzeć gęsi innych gatunków. To właśnie na zbożówki ludzie z reguły mówią dzikie gęsi.

VI. Ekologia gatunku

Łowna z czasem ochronnym.

VII. Słowniczek

Ciąg – przelot ptaków określonymi i powtarzalnymi trasami.

Sady – zbieranie się ptaków na jednym akwenu.

Tabun – większa liczba gęsi.

Wiośła – o nogach ptaków posiadających błonę pławną między palcami.

Ziarniki – oczy.

Pierzenie się – zmiana upierzenia u ptaków.